

## Об эпидемиологической ситуации, связанной с распространением вируса Зика в мире на 31.03.2017


### Справка:

✚ Вирус Зика — это **распространяющийся** вирус, переносимый комарами рода *Aedes*, которые обычно кусают утром и вечером.

✚ Впервые обнаружен у макак резус в Уганде в 1947 году в рамках работы сети мониторинга за лесной формой жёлтой лихорадки. Затем, в 1952 году вирус был выявлен у людей в Уганде и в Объединенной Республике Танзания. Вспышки болезни, вызванной вирусом Зика, зарегистрированы в Африке, Северной и Южной Америке, Азии и Тихоокеанском регионе.

✚ Симптомы заболевания это повышенная температура, кожная сыпь, конъюнктивит, боль в мышцах и суставах, недомогание и головная боль. Эти симптомы обычно слабо выражены и сохраняются в течение 2–7 дней.

Во время крупных вспышек во Французской Полинезии и в Бразилии сообщалось о неврологических и аутоиммунных осложнениях болезни, вызванной вирусом Зика и связи между инфицированием и микроэнцефалией у младенцев.



### ✚ Вирус

Зика передается людям **при укусах заражённых комаров** рода *Aedes*, в основном вида *Aedes aegypti*, обитающих в тропических регионах. Эти же комары являются переносчиками лихорадки денге, чикунгуньи и желтой лихорадки.

От человека к человеку передается через донорскую кровь (при гемотрансфузиях), через плаценту от беременной женщины к плоду,

половым путем (ЧЕРЕЗ СЕКСУАЛЬНЫЕ КОНТАКТЫ).

✚ В настоящее время специфического лечения и вакцины не существует

✚ Наиболее эффективный способ профилактики — защита от укусов комаров. Это также защитит людей от других болезней, передаваемых комарами.


Для этого необходимо использовать репелленты (средства отпугивающие комаров); носить одежду (преимущественно светлую), максимально закрывающую тело; использовать физические барьеры, такие как сетки, закрытые двери и окна и спать под москитными сетками. Важно также опорожнять, мыть и закрывать ёмкости, в которых может скапливаться даже маленькое количество воды, такие как ведра,



цветочные горшки и шины, в целях уничтожения возможных мест размножения комаров. Особенно строго стоит придерживаться этих мер беременным женщинам.

### **Эпидемическая ситуация в настоящее время.**

В настоящее время заболеваемость населения лихорадкой Зика (ЛЗ) в результате местной передачи вируса наблюдается в 48 странах Американского региона, а также ряде государств Юго-Восточной Азии и Тихоокеанского региона.



Общее число пострадавших лиц в странах Американского региона составляет более 551 тыс., у более чем 206 тыс. диагноз подтвержден лабораторно. Число смертельных исходов составило -20 случаев.

В 31-ой стране, из числа пораженных, отмечен рост числа случаев патологий нервной системы новорожденных, в 23 странах выявлено увеличение количества неврологических расстройств, в том числе синдрома Гийена-Барре, связанное со случаями заболевания ЛЗ. В 13 странах выявлена нетрансмиссивная передача вируса Зика (передача при половом контакте, внутриутробное инфицирование, гемотрансфузии).

В Бразилии за время эпидемии ЛЗ зарегистрировано 2366 случаев микроцефалии и неврологических нарушений у новорожденных. Общее число случаев заболевания с подозрением на ЛЗ составляет на 31.03.2017 более 216 тыс. Сложная эпидемиологическая ситуация сохраняется в Колумбии, Сальвадоре, Гондурасе, Венесуэле и ряде других стран региона.

За период с января 2016 по февраль 2017 случаи заболевания лихорадкой Зика регистрировались также в отдельных регионах Юго-Восточной Азии – во Вьетнаме (246 случаев), на Филиппинах (57 случаев), в Малайзии (8 случаев), в Таиланде (713 случаев). В марте 2017 г. новых случаев заболевания лихорадкой Зика на данных территориях не выявлено.

В Республике Сингапур на 13 неделе 2017 г. зарегистрированы два случая заболевания лихорадкой Зика. Общее число случаев заболевания лихорадкой Зика за период с 28 августа 2016 г. по 31 марта 2017 г. составило 466.

Всего за период с января 2015 г. по 31 марта 2017 г. в мире зарегистрированы **8023 завозных случая** лихорадки Зика в 62 странах, в том числе 18 завозных случаев ЛЗ – в Российской Федерации.

***Список стран, неблагополучных в отношении вируса Зика:***

Американское Самоа, Ангола, Ангилья, Антигуа и Барбуда, Аргентина, Аруба, Багамские острова, Барбадос, Белиз, Боливия, Бонэйр, Бразилия, Венесуэла, Виргинские острова(США), Вьетнам, ГайанаГаити, Гваделупа, Гватемала, Гвинея-Бисау, Гондурас, Гренада, Доминика, Доминиканская Республика, Индонезия, Каймановы о-ва, Кабо-Верде, Колумбия, Косрэ, Коста-Рика, Куба, Кюрасао, Мартиника, Маршалловы острова, Мексика, Монсеррат, Никарагуа, Новая Каледония, Панама, Папуа Новая Гвинея, Парагвай, Паулу, Перу, Пуэрто-Рико, Сальвадор, Самоа, СеБартелеми, Сен-Мартен, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Люсия, Синт-Мартен, Синт-Эстатиус и Саба, Суринам, США, Таиланд, Тонга, Теркс и Кайкос, Тринидад иТобаго, Фиджи, Филиппины, Французская Гвиана, Эквадор, Ямайка.

Подготовила информацию

врач-эпидемиолог отдела эпидемиологии Басольго М.В.