

Лихорадка Марбург



Это острое инфекционное заболевание, вызываемое РНК-содержащим филовиром (вирусом Марбург), характеризующееся тяжёлым течением, высокой летальностью, геморрагическим синдромом, поражением печени, желудочно-кишечного тракта и центральной нервной системы.



Крупнейшие вспышки зафиксированы в Анголе, Демократической Республике Конго, Кении, ЮАР, Уганде, Германии. Единичные случаи – в Нидерландах и США. Вспышка в Анголе в 2005 году унесла жизни 329 человек.



Вспышка в Руанде

осенью 2024 года: среди подтвержденных случаев, связанных с лихорадкой Марбург, включая летальные, более 70% – работники организаций здравоохранения.

- Вирус передается людям через летучих мышей *Rousettus aegyptiacus*.
- От человека к человеку — контактным путем (при попадании инфицированного биоматериала на поврежденные кожные покровы и слизистые), а также при контакте с загрязненными биологическими жидкостями поверхностями и материалами (например, постельным бельем, одеждой). Известны случаи заражения половым путем.
- Заболевший остается источником инфекции до тех пор, пока вирус сохраняется в крови.

- Этот вирус трудно контролировать, поскольку люди, которым удастся выздороветь, могут продолжать заражать других спустя несколько месяцев через такие биологические жидкости, как кровь или сперма.
- Основа профилактики: повышение осведомленности населения по предупреждению возможных контактов с летучими мышами, использованию средств индивидуальной защиты при уходе за инфицированными пациентами.

- Инкубационный период лихорадки Марбург – в пределах от 2-х до 21-го дня.

- Лечения этого заболевания не существует. Зарегистрированных вакцин или противовирусных препаратов пока нет.



Первые симптомы: высокая температура, сильная головная боль и общее недомогание, сопровождающиеся сильными мышечными болями и слабостью.

Симптомы на 3-й день:

острая водянистая диарея, рвота, тошнота, боль или спазмы в области живота.



Симптомы на 7-й день:

кровотечение из десен носа, влагилица, ануса или других частей тела. В целом в смертельных случаях обычно наблюдаются множественные кровоизлияния в несколько органов одновременно. Поражение центральной нервной системы проявляется в спутанности сознания, раздражительности и агрессивности.

