

ЖЕЛТАЯ ЛИХОРАДКА

Это острое вирусное инфекционное заболевание, передаваемое комарами родов *Aedes* (в Африке и Южной Америке) и *Haemagogus* (в Южной Америке).



Источник инфекции

больные животные и
больной человек

Инкубационный период

3 – 6 дней

Симптомы заболевания

Повышение температуры тела, мышечная и головная боль, потеря аппетита, тошнота, рвота, возможны геморрагические проявления (например, носовые кровотечения, кровоточивость десен), пожелтение кожных покровов и склер, поражение печени и почек. Летальность при токсической форме достигает 50%.

Меры профилактики при посещении эндемичных стран

Избегайте контакта с насекомыми, применяйте различные репелленты, электрофумигаторы. Целесообразно использовать в помещениях противомоскитные сетки и защитные пологи, при совершении прогулок – закрытую одежду.

Вакцинация – основная мера профилактики желтой лихорадки. После вакцинации против желтой лихорадки выдается Международное свидетельство, которое действительно в течение всей жизни.

Вакцинация проводится в учреждении здравоохранения «19-я центральная районная поликлиника Первомайского района г. Минска» (г. Минск, пр. Независимости, 119, контактный телефон для предварительной консультации и записи: 8017-325-08-99).

