


СИБИРСКАЯ ЯЗВА: ПРОФИЛАКТИКА

Сибирская язва – это инфекционная болезнь, возбудителем которой является спорообразующая бактерия *Bacillus anthracis*.

В ЧЕМ ОСОБЕННОСТЬ ИНФЕКЦИИ

Это зоонозная инфекция (заболевание, передаваемое от животных человеку), которая, как правило, поражает травоядных животных (таких как коровы, овцы и козы). Бактерии выделяют чрезвычайно мощные токсины, которые отвечают за симптомы, вызывающие высокий процент смертности. Люди могут заразиться от инфицированных животных или через зараженные продукты животного происхождения.




КАК ПРОТЕКАЕТ ЗАБОЛЕВАНИЕ



Заболевание чаще всего начинается через несколько часов до 14 дней после попадания возбудителя в организм человека, чаще всего 2-3 дня. У 95% больных наблюдается кожная форма, редко – легочная и очень редко – кишечная.

МЕРЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРОФИЛАКТИКИ:

- соблюдение ветеринарно-санитарных правил при заготовке, хранении, транспортировке и обработке сырья животного происхождения;
- проведение иммунизации групп профессионального риска.



МЕРЫ ЛИЧНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ:

- не приобретать мясные и молочные продукты в местах несанкционированной торговли;
- исключить контакт с заболевшим животным либо инфицированными продуктами животного происхождения;
- не участвовать в вынужденном убое, разделке туш и захоронении трупов павших животных;
- не рекомендуется приобретать меховые, кожаные изделия у частных торговцев;
- соблюдать правила личной гигиены.

При появлении симптомов не занимайтесь самолечением. Своевременное обращение за медицинской помощью и лечение – залог благополучного исхода!