



ГЕМОФИЛИЯ

«Это редкое наследственное нарушение свертывания крови, обусловленное мутацией в X-хромосоме».

НА ЧТО ВЛИЯЕТ ЗАБОЛЕВАНИЕ?

Влияет на способность крови к свертыванию, что означает, что у пациентов кровотечение продолжается дольше, чем у людей без гемофилии.



ТИПЫ ГЕМОФИЛИИ:

- A** (недостаточность фактора VIII)
- B** (недостаточность фактора IX)
- C** (недостаточность фактора XI)

ГЕМОФИЛИЯ А

НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННАЯ
ТЯЖЕЛАЯ ФОРМА ЗАБОЛЕВАНИЯ



1 из 10 000
новорожденных
болен гемофилией



Диагностируется
в возрасте **до 2 лет**,
когда дети учатся ходить

ЛЕЧИТЬ ГЕМОФИЛИЮ У ДЕТЕЙ ОСОБЕННО ТРУДНО:



Лечение
продолжается
всю жизнь



В 7-10 лет дети начинают
самостоятельно вводить
факторы свертываемости крови



Внутривенные введения
факторов не дают 100%
защиты от кровотечений

**В отсутствие профилактики у детей с гемофилией
высок риск повреждения суставов и внутренних органов**

СХЕМА НАСЛЕДОВАНИЯ

