

Лептоспироз: Скрытая угроза от животных

Кто является источником инфекции?



Дикие животные и грызуны

Основными носителями в природе являются серые полевки, мыши, крысы, ежи и землеройки.



Домашний скот и питомцы

Источником могут быть собаки, крупный рогатый скот, реже свиньи, овцы, козы, лошади, а также пушные звери клеточного содержания (лисицы, песцы, нутрии).

Лептоспироз — острое природно-очаговое инфекционное заболевание, которое передается человеку от животных; характеризуется поражением капилляров, мышц, печени, почек, явлениями интоксикации, часто протекает с желтухой. Возбудители лептоспироза — спирохеты, относящиеся к роду *Leptospira*.

Как происходит заражение?




Контакт с водой и почвой

Купание в стоячих водоемах, рыбалка, хождение босиком по песку или работа с влажной землей — основные пути передачи.



Живучесть возбудителя

Лептоспиры сохраняют патогенность в пресных водоемах и влажной почве в течение нескольких месяцев, успешно переживая зиму.



Отсутствие передачи от человека

Лептоспиры не передаются от больного человека к здоровому, источником всегда является животное или внешняя среда.



Входные ворота инфекции

Бактерии проникают через кожу (как поврежденную, так и неповрежденную), а также слизистые оболочки глаз, носа и рта.

Распознать болезнь: Симптомы



Инкубационный период: 3-20 дней

Чаще всего первые признаки проявляются через 6-14 дней после контакта с инфекцией.



Острое начало заболевания

Резкий подъем температуры до 39-40°C, сильная головная боль, мышечная боль, усиливающиеся при движении и пальпации.



Специфические признаки

Могут появиться сыпь, желтушность кожи, кровоизлияния в склеры глаз («глаза ныряльщика») и носовые кровотечения.



Защитная одежда

При работе с сельским хозяйстве или уходе за животными обязательно используйте влагонепроницаемые перчатки и сапоги



Только стационарное лечение

Лечение лептоспироза проводится исключительно в больнице, ранее обращение к врачу значительно повышает шансы на выздоровление.