МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

ГЕМОФИЛИЯ

«Это редкое наследственное нарушение свертывания крови, обусловленное мутацией в Х-хромосоме».

НА ЧТО ВЛИЯЕТ ЗАБОЛЕВАНИЕ?

Влияет на способность крови к свертыванию, что означает, что у пациентов кровотечение продолжается дольше, чем у людей без гемофилии.



в мире больны **400** тысяч людей

ТИПЫ ГЕМОФИЛИИ:

A (недостаточность фактора VIII)
B (недостаточность фактора IX)
C (недостаточность фактора XI)

ГЕМОФИЛИЯ А

НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННАЯ ТЯЖЕЛАЯ ФОРМА ЗАБОЛЕВАНИЯ

1 из 10 000 новорожденных болен гемофилией

Диагностируется в возрасте **до 2 лет**, когда дети учатся ходить

ЛЕЧИТЬ ГЕМОФИЛИЮ У ДЕТЕЙ ОСОБЕННО ТРУДНО:

Лечение продолжается всю жизнь

В 7-10 лет дети начинают самостоятельно вводить факторы свертываемости крови

Внутривенные введения факторов не дают 100% защиты от кровотечений

В отсутствие профилактики у детей с гемофилией высок риск повреждения суставов и внутренних органов

СХЕМА НАСЛЕДОВАНИЯ

У больных отцов рождаются здоровые сыновья, либо дочери-носители

Риск родить ребенка, страдающего гемофилией, от матери-носительницы составляет 25%



У больного отца и матери-носительницы все дети рождаются больными

ГУ «Слуцкий зональный центр гигиены и эпидемиологии»