

ИНФЕКЦИИ, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ ПОЛОВЫМ ПУТЁМ

ЕЖЕГОДНО



В МИРЕ

БОЛЕЕ **1 000 000**



15-49 лет

СИФИЛИС, ГОНОРЕЯ, ХЛАМИДИОЗ, МИКОПЛАЗМОЗ, УРЕАПЛАЗМОЗ,
ВИЧ-ИНФЕКЦИЯ, ГЕНИТАЛЬНЫЙ ГЕРПЕС, ГЕПАТИТЫ В И С, ПАПИЛОМАВИРУС ЧЕЛОВЕКА,
КАНДИДОЗ, ЦИТОМЕГАЛОВИРУС, ТРИХОМОНИАЗ, ЧЕСОТКА, ЛОБКОВЫЙ ПЕДИКУЛЁЗ



ПОЛОВОЙ (незащищённый половой акт)



КОНТАКТНО-БЫТОВОЙ (использование общих полотенец, мочалок и т.д.)



ПАРЕНТЕРАЛЬНЫЙ (переливание крови, трансплантация органов, нестерилизованный инструментарий, инъекционное введение наркотиков)



ВНУТРИУТРОБНЫЙ (во время беременности) и **ВЕРТИКАЛЬНЫЙ** (во время родов)

Многие ИППП протекают бессимптомно
или с незначительными симптомами –
**В РЕЗУЛЬТАТЕ ЧЕГО МОГУТ ОСТАВАТЬСЯ
НЕВЫЯВЛЕННЫМИ**

Отказ от рискованного сексуального поведения –
ОСНОВА ПРОФИЛАКТИКИ ИППП

ПЕРВЫЕ ПРИЗНАКИ ИНФЕКЦИИ:

- ❖ Необычные выделения из мочеполовых путей
- ❖ Зуд, жжение и боль в области половых органов
- ❖ Высыпания (язвочки, пузырьки) на половых органах
- ❖ Болезненные ощущения во время полового акта
- ❖ Дискомфорт и боль при мочеиспускании



Пройти
обследование
можно в
любой
поликлинике

ПОД РИСКОВАННЫМ СЕКСУАЛЬНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ ПОНИМАЮТ:

- ❖ Ранее начало половой жизни
- ❖ Незнание как защитить себя от половых инфекций
- ❖ Частая смена и отсутствие постоянного сексуального партнёра
- ❖ Случайные половые контакты

При отсутствии лечения ИППП могут иметь серьёзные последствия для репродуктивного здоровья!